

Комбинированный препарат с антибактериальным и противовоспалительным действием



В 1 мл препарата содержится в качестве действующих веществ 200 мг азитромицина и 2 мг мелоксикама, а также вспомогательные вещества

- Быстрый терапевтический эффект.
- Содержит селективный НПВС.
- Обезболивающее и жаропонижающее действие.
- Направленное действие - высокая концентрация в очаге воспаления.
- Форма выпуска - раствор для инъекций: отсутствие инфильтратов после введения; не требует подготовки перед введением.

Механизм действия

Механизм действия азитромицина связан с торможением биосинтеза белка рибосомами бактерий, в результате чего нарушается образование пептидных связей между аминокислотами и пептидной цепью.

Механизм действия мелоксиками основан на подавлении синтеза простагландинов за счет избирательного ингибирования циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2). Незначительно влияет на циклооксигеназу-1 (ЦОГ-1), сводя, таким образом, к минимуму такие побочные эффекты, как образование язв, кровотечения, нарушение функции почек.

Показания к применению

Азитрикам 200 применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям и собакам для лечения при бактериальных инфекциях органов дыхания, пищеварительной и мочеполовой системы, инфекциях кожи и мягких тканей, сопровождаемых воспалительными процессами и вызываемых микроорганизмами, чувствительными к азитромицину, а также при некробактериозе, роже свиней, спирохетозе и микоплазменных инфекциях

Порядок применения

Препарат вводят внутримышечно. В зависимости от тяжести заболевания препарат применяют один раз в сутки в течение 3-4 дней в дозе 0,5 мл на 20 кг массы тела животного

Сроки ожидания

Убой на мясо крупного и мелкого рогатого скота, свиней разрешается не ранее чем через 40 суток после последнего введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

Срок годности

36 месяца

Вид животного

Крупный рогатый скот, Мелкий рогатый скот, Свиньи, Собаки