

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета
ветеринарного контроля и надзора
МСХ РК

«____» _____ 2023

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Тилмикозин 25%
для лечения сельскохозяйственных животных и птицы при болезнях
бактериальной этиологии

(Организация-разработчик: ООО «НПФ «АЛИСА»,
117042, г. Москва, ул. Чечерский проезд, д.120, к.1, помещение 1/1.)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Торговое наименование лекарственного препарата:

Тилмикозин 25% (Tilmicosin 25%)

1.2. Международное непатентованное наименование действующего вещества: тилмикозина фосфат.

1.3. По внешнему виду препарат представляет собой раствор от желтого до темно-коричневого цвета.

1.4. В 1 см³ препарата в качестве действующего вещества содержится 250 мг тилмикозина фосфата, а также вспомогательные вещества и вода.

1.5. Выпускают препарат расфасованным во флаконы и канистры из полимерных материалов по 1 и 5 л, укупоренные завинчивающимися крышками с контролем первого вскрытия.

1.6. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

1.7. Препарат хранят в упаковке изготовителя с предосторожностью (список Б) при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов.

1.8. Срок годности - 2 (два) года со дня изготовления при условии соблюдения правил хранения. Срок годности после первого вскрытия упаковки – 28 дней.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. Тилмикозина фосфат в составе препарата - полусинтетический антибиотик из группы макролидов с широким спектром действия. Активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Pasteurella* spp., *Clostridium* spp., *Arcanobacterium* spp. (*Corynebacterium*), *Brachyspira hyodysenteriae*, *Chlamydia* spp., *Spirocheta* spp., *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mannheimia haemolytica* и *Mycoplasma* spp.

2.2. Механизм бактериостатического действия тилмикозина заключается в блокировании белкового синтеза в микробной клетке на рибосомальном уровне. Кроме выраженного антибактериального действия, тилмикозин обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным эффектами.

2.3. При пероральном введении Тилмикозин 25% хорошо и быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в большинство органов и тканей, прежде всего в ткани респираторной системы, и накапливается в альвеолярных макрофагах. Через 2-3 часа тилмикозин достигает максимального уровня в сыворотке крови, умеренно связывается с белками плазмы (менее 30%), терапевтические концентрации сохраняются в организме на протяжении 24 часов. Выводится препарат из организма в основном в неизмененном виде, в большей степени с желчью, частично с мочой и фекалиями.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1. Тилмикозин 25% применяют сельскохозяйственным животным и птице в качестве лечебного средства при пастереллезе, стафилококкозе, стрептококкозе, клостридиозе, хламидиозе, микоплазмозе, коринебактериозе,

дизентерии и других инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к тилмикозину.

3.2.. Препарат применяют перорально индивидуально или групповым методом с водой для поения в следующих дозах:

- Птице групповым методом - 0,3 мл на 1 литр питьевой воды в течение 3-5 дней. Индивидуально – 15-20 мг/кг по АДВ в течение 3 дней.

- Свиньям групповым методом 0,8 мл на 1 литр воды, индивидуально – 15-20 мг/кг по АДВ в течение 5 дней.

3.3. Приготовленный раствор препарата необходимо использовать в течение 24 часов. В период лечения животные и птица должны получать только воду, содержащую препарат.

3.4. В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. У животных с повышенной индивидуальной чувствительностью возможно возникновение аллергических реакций (судорог, тремора, рвоты), в этом случае препарат отменяют и применяют антигистаминные препараты (димедрол, дипразин) и препараты кальция (кальция глюконат и ли кальция хлорид). При необходимости применяют симптоматические средства.

3.5. Противопоказано применение препарата животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к макролидам. Не рекомендуется одновременное применение с препаратами из групп пенициллина, цефалоспоринов и аминогликозидного ряда, а также в течение семи дней до и после применения ионоформных эймериостатиков, ввиду возможного возникновения у животных побочных явлений и осложнений (диарея, парезы, нефротоксические эффекты). Не применяют животным с нарушениями функции почек и/или печени.

3.6. Запрещено применять препарат птицам (курам-несушкам и другим), чье яйцо используется в пищу людям. Препарат не применяют беременным и лактирующим животным, а также жвачным с развитым рубцовым пищеварением.

3.7. Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 12 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых ранее указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям или для переработки на мясокостную муку.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты.

4.2. Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

4.3. После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

4.4. Тилмикозин 25% хранить в местах недоступных для детей.

4.5. Пустую тару из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации.

Организация - разработчик.

ООО «НПФ «АЛИСА», 117042, г. Москва,
ул. Чечерский проезд, д.120, к.1, помещение
1/1.

Наименования и адреса производственных
площадок производителя лекарственного
препарата для ветеринарного применения.

ООО «ЭЛИКСИР-Д», 362013, РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул.4-я Промышленная, д. 1 «а»

Организация - разработчик уполномочена на
принятие претензий от потребителя.