

ИНСТРУКЦИЯ по применению порошка «Тилар»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Порошок «Тилар» (Pulvis «Tylarum»).
- 1.2 Препарат представляет собой аморфный белый порошок, иногда со слегка желтоватым оттенком.
- 1.3 В 100,0 г препарата содержится тилозина тартрата 50,0 г и наполнителя (глюкозы или лактозы) до 100,0 г.
- 1.4 Препарат расфасовывают в пакеты из ламинированной фольги по 200, 500 и 1000 г.
- 1.5 Препарат хранят по списку Б в защищенном от света и влаги месте при температуре от плюс 2°С до плюс 30°С.
- 1.6 Срок годности 3 (три) года от даты изготовления.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Порошок «Тилар» представляет собой антибиотик из группы макролидов. Механизм действия препарата заключается в нарушении синтеза белка на уровне рибосом путем блокирования фермента транслоказы.
- 2.2 Порошок «Тилар» оказывает губительное действие на микоплазм, хламидий, пастерелл, клостридий, риккетсий, некоторых видов стрептококков, стафилококков и спирохет, эризипелотриксос, бореллий, балантидий.
- 2.3 Препарат хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте и после резорбции быстро проникает во все органы и ткани животного. Из организма выделяется с мочой и фекалиями.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- 3.1 Порошок «Тилар» применяют индивидуально и групповым методом с целью профилактики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота) и птицы, вызванных чувствительными микроорганизмами к данному препарату; заболеваний респираторного и желудочного тракта (пневмонии, бронхиты, синуситы, гастроэнтериты, дизентерия, балантидиоз).
- 3.2 Порошок «Тилар» применяют внутрь с кормом или водой из расчета: с лечебной целью 5 мг/кг массы животного 2 раза в сутки по АДВ, и с профилактической 5 мг/кг массы животного 1 раз в сутки по АДВ в течение 7-10 дней подряд.
- 3.3 Птице порошок «Тилар» применяют в дозе 1,0 г препарата растворенного в 1 литре воды в течение 2-5 дней в зависимости от тяжести заболевания.
- 3.4 Не допускается применение порошка «Тилар» в корм несушкам.
- 3.5 Препарат противопоказан при аллергии на антибиотики группы макролидов (эритромицин, олеандомицин, азитримидин).
- 3.6 При применении препарата возможно проявление побочных реакций: зуд кожи, крапивница, угнетение, тошнота, рвота.
- 3.7 При возникновении побочных реакций применение препарата следует прекратить и назначить антигистаминные (димедрол, дипразин) препараты и препараты кальция (кальция глюконат, кальция борглюконат).
- 3.8 Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, убитых ранее установленных сроков, используют для кормления плотоядных животных. Молоко во время лечения можно использовать на корм животных. В пищу людям молоко использовать не ранее, чем через 5 суток после последнего применения препарата.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием марлевых повязок или респираторов, защищающих дыхательные пути от попадания препарата.

4.2 Во время работы с препаратом запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

4.3 После окончания работы с препаратом руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил применения этого препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

6.1 ООО «Рубикон», г. Витебск, Республика Беларусь

Инструкция по применению разработана заведующим кафедрой фармакологии и токсикологии доцентом Толкачем Н.Г., доцентом кафедры фармакологии и токсикологии Петровым В.В., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины».

