

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО Нувихим

Рылов Д. К.

2018 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению CLEARAN DIP I EXTRA для
антисептической обработки сосков и вульвы свиноматок
(организация-производитель – ООО Нувихим, РОССИЯ)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. CLEARAN DIP I EXTRA - средство обладает антисептическим действием, заживляет кожные повреждения, смягчает и питает кожу. Содержит в своем составе: йодсодержащий высокомолекулярный полимер не менее 4000 ppm., глицерин, аллантоин и сорбитол.
2. CLEARAN DIP I EXTRA представляет собой готовую к использованию жидкость коричневого цвета с запахом йода.
3. Выпускают CLEARAN DIP I EXTRA расфасованным в 10 литровые полимерные пластиковые канистры.
4. Хранят CLEARAN DIP I EXTRA в невскрытой упаковке от производителя при температуре от +1 °С до +30 °С.
Срок годности CLEARAN DIP I EXTRA в невскрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.
5. CLEARAN DIP I EXTRA следует хранить в местах не доступных для детей.
6. Неиспользованное средство утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. СВОЙСТВА

7. CLEARAN DIP I EXTRA – средство обеспечивает антисептический эффект, заживляет кожные повреждения, смягчает и питает кожу. Поддерживает гигиенические условия до и после опороса. Предупреждает от вертикальной и горизонтальной передачи потенциально патогенных микроорганизмов.

По степени острой токсичности CLEARAN DIP I EXTRA относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.01.007-76): ЛД₅₀ при введении в желудок и нанесении на кожу. Местно-раздражающее и кожно-резорбтивное действие средства при повторном воздействии на кожу не выявлено. Средство не обладает сенсibiliзирующим, кумулятивным свойствами и специфическими отдаленными эффектами (мутагенным, эмбриотоксическим, гонадотоксическим и канцерогенным).

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. CLEARAN DIP I EXTRA применяют наружно способом мелкокапельного опрыскивания (спрея) с помощью распыляющего устройства:
- перед опоросом, распылить средство CLEARAN DIP I EXTRA, на соски и вульву свиноматки;
 - при необходимости обрабатывать соски 1 раз в день в течении 2-х дней после опороса.

При обработке животных соблюдать технику безопасности.

IV. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

9. Использовать только для наружного применения.
10. Не допускать попадания средства в глаза.
11. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течении 10 -15 минут, затем закапать раствор 30% сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.
12. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с 10 – 12 таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

Инструкция разработана компанией ООО Нувихим (Санкт-Петербург).